

# 



STATION  
POITOU-CHARENTES

BIBLN  
13503 03003 00097 3143A 22/05/92-15h U  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
REGIE DEPOT LEGAL  
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE  
58, RUE RICHELIEU

Bulletin n° 218-1 (11/92) du 22 Mai 1992

75000 PARIS

TOURNESOL : Surveiller les pucerons  
MAIS, Sésamie : Début de vol sur le sud de la région  
: Programmer vos interventions première semaine de Juin dans les zones à risques.

## TOURNESOL

### PUCERONS

#### Situation

Le vol est en cours. Certains secteurs sont particulièrement concernés (notamment le Marais Poitevin).

#### Préconisation

- \* Votre tournesol n'a pas atteint le stade B5 (la cinquième feuille a moins de 4 cm de long) : la présence de plus de 30 à 50 pucerons par plante en moyenne vous conduira à effectuer un traitement à l'aide de l'un des 8 produits homologués à cet effet.
- \* Votre tournesol a atteint ou dépassé le stade B5 : il peut supporter une quantité plus importante de pucerons. N'intervenir que si vous dépassez 50 à 100 pucerons par plante.
- \* Après le stade "bouton étoilé" : intervention inutile.

### SCLEROTINIA

#### Situation

L'attaque sur bourgeon terminal peut se produire à partir du stade 4 à 6 feuilles visibles jusqu'au moment où le bouton floral est bien dégagé. La durée des séquences climatiques favorables déterminera la gravité finale de l'attaque. Pour le moment, aucune période favorable ne s'est produite sur la région.

#### Préconisation

- \* Variétés très tolérantes (Albena, Frankasol, Eurosol...) : aucune intervention chimique.
- \* Variétés très sensibles (Vidoc, Oscar...) : intervention préventive systématique dès l'annonce d'une période humide à partir du stade 4-6 feuilles.
- \* Variétés intermédiaires (Vidéo, Alphasol...) : déclencher éventuellement une intervention après une période humide importante et avant toute apparition de symptômes.

## MAIS

### SESAMIE

#### Situation

Les premières captures de sésamies sont signalées en Sud Charente autour du 15 Mai et autour du 20 Mai en Charente Maritime. Le vol devrait s'étaler sur un mois à un mois et demi avec un pic de vol situé début Juin.

#### Préconisation

Dans les zones à risque, on raisonnera l'intervention comme suit :

- \* Arrivée au stade "2 feuilles" avant le 30 Mai :  
1er traitement : 1ère semaine de Juin ;  
Renouvellement : 15 jours plus tard.
- \* Arrivée au stade "2 feuilles" entre le 31 Mai et le 10 Juin :  
Un seul traitement autour du 10 Juin à dose pleine.
- \* Arrivée au stade "2 feuilles" après le 10 Juin :  
Attendre un prochain bulletin.

#### Modalités de traitement

Traiter par voie terrestre (tracteurs) avec des jets pinceaux sans réduire les volumes d'eau :  
300 l/ha en localisé ; 400 l/ha en plein ; 500 l/ha à partir du stade 8 feuilles.

## BLE - ORGE

### PUCERONS

#### Situation

Les colonisations en parcelles se poursuivent. Nous rappelons le seuil d'intervention qui n'est pas atteint sur la région à l'heure actuelle : 1 épi sur 2 colonisés jusqu'au stade grain laitex.

#### Préconisation

~~Ne pas intervenir si le seuil n'est pas atteint.~~



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
13, Rte de la forêt - 86580 BIAUD  
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique  
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL  
CPPAP no. 1664 A.D.  
ISSN 0294 - 4693

P17